

## INDICAZIONI POST-CHIRURGICHE PER INTERVENTI DI IMPLANTOLOGIA

- **Durante la giornata dell'intervento** applicare sulla cute del viso in corrispondenza della zona operata la borsa del ghiaccio alternando 10 minuti di ghiaccio a 10 minuti senza ghiaccio.
- **Nel post-intervento** si possono verificare piccole perdite ematiche nella zona dei punti di sutura. In questi casi è necessario esercitare una leggera pressione sulla parte introducendo in bocca un tampone di garza bagnata e serrando delicatamente le mascelle. Evitare di risciacquare la bocca a lungo al fine di consentire la formazione di un adeguato coagulo.
- Dieta liquida e fredda in **prima giornata**
  - Dieta semi-solida per 7 giorni, evitare di masticare nella zona operata, usare solo la contro laterale
- **Evitare il fumo** per almeno 10 giorni
- Non stirare MAI il labbro per visionare la ferita, non toccare e non fare pressione con la lingua sui punti di sutura
- Evitare per qualche giorno attività fisiche intense perché potrebbero indurre sanguinamento delle ferite
- Utilizzare un collutorio a base di **clorexidina 0.20%** non diluito per 3 volte al giorno per 1 minuto ogni volta per i 7 giorni successivi all'intervento.
- Gonfiore (soprattutto dopo 24/48 ore) ed eventuale comparsa di ematomi (lividi) sono segni da interpretare come normali
- Seguire scrupolosamente le indicazioni farmacologiche

*Vi ricordiamo che la buona riuscita di un intervento chirurgico è fortemente influenzata dalla vostra collaborazione*

*Comportamenti alimentari errati sono la principale causa di insuccesso negli interventi chirurgici in ambito orale*